

## **Ένα αγκάθι για τον 'εγκεφαλικό θάνατο' (Εμμ. Παναγόπουλος, Αμ. Επίκ. Καθηγ. Χειρουργικής)**

**Date :** Φεβρουαρίου 11, 2014

Η διατήρηση στην ζωή  
έγκεφαλικά νεκρών έγκυων γυναικών για κάποιες εβδομάδες με στόχο το  
κυοφορούμενο έμβρυο να γίνει βιώσιμο και να γεννηθεί χωρίς προβλήματα,  
είναι ένα μεγάλο αγκάθι στην άποδοχή του έγκεφαλικού θανάτου. **Μέχρι  
σήμερα στην διεθνή βιβλιογραφία έχουν αναφερθεί περισσότερες από 20  
περιπτώσεις με μέγιστο χρόνο υποστηρίξεως της ζωής 90 με 110 ημέρες.**

Μία τέτοια περίπτωση παρουσιάστηκε πρόσφατα στο  
διαδίκτυο (Νοέμβρ. 2013) από πολλούς διαδικτυακούς ιστοτόπους., όπως το  
[euronews.com](http://euronews.com), [lifenews.com](http://lifenews.com), [News.Va](http://News.Va) και άλλους.

Η πρόσφατη περίπτωση άφορϋσε σε μία 31 έτων έγκυο  
γυναίκα στην 15η εβδομάδα της κύησης, η οποία διακομίσθηκε την άνοιξη  
του 2013 στο University of Debrecen Medical Center της ανατολικής  
Ούγγαρίας, με έγκεφαλική αίμορραγία και υπεβλήθη άμέσως σε χειρουργική  
έπέμβαση. Όμως δύο ημέρες μετά διαπιστώθηκε η έγκατάσταση έγκεφαλικού  
θανάτου. Η οίκογένειά της μαζί με τους γιατρούς άποφάσισαν να την  
κρατήσουν στην ζωή, δίνοντας έτσι την εύκαιρία στο κυοφορούμενο παιδί  
της να γίνει βιώσιμο και να γεννηθεί υγιές. Τον Ιούλιο του 2013, ύστερα  
άπό 92 ημέρες έντατικής υποστηρίξεως της μητέρας και ένω διένυε την 27η  
έβδομάδα της κύησης, το μωρό γεννήθηκε με καισαρική τομή. Η υποστήριξη  
της μητέρας συνεχίσθηκε για άλλες δύο ημέρες και έν συνεχεία τα όργανά  
της δόθηκαν σε τέσσερις άναμένοντες άσθενείς. Οί γιατροί και η  
οίκογένεια δέν δημοσιοποίησαν άμεσα την περίπτωση, γιατί ήθελαν να είναι  
σίγουροι για την υγεία του νεογνού, το όποιο σήμερα είναι άπολύτως  
υγιές με την οίκογένειά του.

Η περίπτωση αυτή, όπως και οί  
προηγούμενες παρόμοιες  
περιπτώσεις, ύποδηλώνουν την μεγάλη πρόοδο της ύποστηρικτικής άγωγής  
στις Μονάδες Έντατικής Θεραπείας, αλλά ταυτόχρονα θέτουν και το έρώτημα  
πώς μια νεκρή γυναίκα μπορεί να συντηρεί την ζωή του κυοφορουμένου  
παιδιού της για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Μερικοί ίσως βιαστούν να  
άπαντήσουν ότι η γυναίκα ήταν όντως νεκρή και άπλά το σώμα της έπαιξε  
τόν ρόλο μίας σύγχρονης θερμοκοιτίδας, μέσα στην όποια έπιβιώνουν τα  
πρώρα νεογνά. Όμως τα ίατρικά δεδομένα άλλα δείχνουν και δέν συμφωνούν

μὲ τὴν ἄποψη αὐτή.

Σήμερα τὸ ὄριο

βιωσιμότητας ἑνὸς νεογνοῦ τοποθετεῖται στὴν 24ῃ ἐβδομάδα τῆς κηύσεως, μὲ μία γκρίζα περιοχὴ μεταξὺ τῆς 22ῃς καὶ 24ῃς ἐβδομάδος. Τὸ μικρότερο νεογνὸ ποὺ ἔχει ἐπιζήσει ἦταν 21 ἐβδομάδων καὶ 6 ἡμερῶν. Οἱ περισσότεροι νεογνολόγοι δὲν ἐπιχειροῦν κἂν ἀνάληψη νεογνῶν μικρότερων τῶν 22 ἐβδομάδων, γιατί ἡ ἐπιβίωσή τους χωρὶς μείζονες ἀναπηρίες εἶναι ἐξαιρετικὰ σπάνια. Ἡ ἐπιβίωση κάτω τῆς 21ῃς ἐβδομάδος εἶναι πρακτικὰ μηδενική. Ἐτσι ἓνα ἔμβρυο στὴν 15ῃ ἐβδομάδα τῆς κηύσεως, ὅπως στὴν ἀναφερομένη περίπτωση δὲν εἶχε καμία πιθανότητα ἐπιβιώσεως ἐκτὸς μήτρας. Ὅμως μέσα στὴν μήτρα τῆς ἐγκεφαλικά νεκρῆς μητέρας τοῦ ἐπέζησε γιὰ 12 ἐβδομάδες καὶ γεννήθηκε χωρὶς ἀνωμαλίες καὶ σήμερα εἶναι ἀπολύτως ὑγιές. Τὸ σῶμα τῆς ἐγκεφαλικά νεκρῆς γυναίκας προφανῶς βιολογικὰ ἦταν ζωντανό, γι' αὐτὸ καὶ συντήρησε τὴν ζωὴ τοῦ ἐμβρύου γιὰ ἓνα τόσο μεγάλο χρονικὸ διάστημα.

**Οἱ περιπτώσεις**

**τῶν ἐγκεφαλικά νεκρῶν ἐγκύων ποὺ συντηροῦνται στὴν ζωὴ, δείχνουν μὲ τὸν**

**πλέον ἐναργῆ καὶ σαφῆ τρόπο ὅτι ὁ ἐγκεφαλικά νεκρὸς δὲν εἶναι βιολογικὰ**

**νεκρός.** Ἀσφλῶς ἡ ζωὴ του εἶναι ὑποβαθμισμένη καὶ ἔντονα ὑποστηριζομένη ἀπὸ τὴν σύγχρονη ἰατρικὴ γνώση καὶ τεχνολογία, εἶναι ὅμως ζωὴ ποὺ μπορεῖ νὰ συντηρεῖ μιὰ ἄλλη ζωὴ, αὐτὴ τοῦ κυοφορουμένου ἐμβρύου.

(Πηγή: περιοδ. «*Η ΔΡΑΣΙΣ ΜΑΣ*», ἀρ. τ. 516, Φεβρ. 2014, Ἡλ. στοιχειοθ.: «*ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ*»)